

ANNE-BABALAR İÇİN
BİLGİLENDİRME

Kene Isırığı



Zürih Çocuk Hastanesi Acil Servisi

Ücretli danışmanlık hattı: 0900 266 711

Çocuğum üzerinde bir veya birden fazla kene bulduğumda nasıl davranmalıyım?

Kene(ler) olabildiğince hızlı bir şekilde bir cımbız yardımıyla çıkarılmalıdır(lar). Kene çıkartılırken mümkün olduğunca direkt cildin dibinden yakalanmalı ve düz bir şekilde arkaya doğru ısırıldığı kanaldan çekilip çıkartılmalıdır. Şayet yanınızda cımbız yoksa kene başparmak ve işaret parmağının tırnakları arasına sıkıştırılıp çıkartılabilir. Isırılan yer sonrasında standart bir dezenfektan ile mikroplardan arındırılmalıdır.

Dikkat: Kene çıkarılırken mümkün olduğunca az döndürülmesine dikkat edilmelidir. Kenenin üzerine herhangi bir yağ da sürülmemelidir! Şayet kene çıkarılırken kenenin başı ya da bacakları deride kalırsa, bunların hemen çıkarılması gerekmez. En önemli şey, kenenin vücudunun, özellikle de mide ve bağırsak sisteminin bulunduğu kısmın çıkarılmasıdır.

Kenenin saklanması gerekmez, çünkü üzerinde inceleme yapılmayacaktır.

Kene ısırığından sonra nelere dikkat etmeli ve ne zaman doktora gitmeliyim?

- Şayet kene ısırığından 3-32 gün sonra ısırılan yerin etrafında ya da olasılıkla vücudun başka yerlerinde yavaşça yayılan, ağrısız, halka şeklinde kızarıklık oluşursa doktora gidilmelidir.
- Kene ısırığından 7-14 gün sonra ateş veya şiddetli baş ağrıları ortaya çıktığında.
- Özellikle dizde ya da ayak bileği ekleminde belirsiz eklem şişlikleri olduğunda (kene ısırığından haftalar ya da aylar sonra ortaya çıkabilir).
- Tek taraflı yüz felci meydana geldiğinde (kene ısırığından 3-10 hafta sonra ortaya çıkabilir).

