

# Behandlungsplan für das allergische Kind



Groupement des Pédiatres Immunologues / Allergologues Suisses  
Arbeitsgruppe Pädiatrische Immunologie / Allergologie Schweiz  
Gruppo dei Pediatri Immunologi / Allergologi Svizzeri

Datum : .....

Name	Vorname	Geburtsdatum
------	---------	--------------

## BEHANDLUNG IM FALLE EINER ALLERGISCHEN REAKTION

Reaktion	Symptome	Behandlung	Dosis
<b>Leichte generalisierte allergische Reaktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juckreiz</li> <li>• Hautausschlag</li> <li>• Schwellung im Gesicht oder der Lippen <sup>×</sup></li> <li>• Kribbeln im Mund</li> <li>• Bauchschmerzen <sup>×</sup></li> </ul>	<i>Antihistaminikum :</i> ..... ..... ..... <sup>×</sup> + <i>Cortison :</i> ..... .....	..... Wiederholen, wenn nach 2Std. keine Besserung eintritt
<b>Starke generalisierte allergische Reaktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Husten</li> <li>• Mühe beim Schlucken, beim Sprechen, beim Atmen</li> <li>• Pfeifende Atemgeräusche</li> <li>• Asthmaanfall und /oder Atemnot</li> <li>• Blutdruckabfall</li>   <li>• Bewusstlosigkeit, Kollaps</li> </ul>	<u>Injektion intramuskulär:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Epipen<sup>®</sup>/Jext<sup>®</sup> oder  Epipen<sup>®</sup> Jr/ Jext<sup>®</sup> 0,15mg</li> <li>• Notruf 144</li> <li>• <i>liegende Position, Beine hoch, Kopf tief</i> <i>Im Fall von Bewusstlosigkeit: Seitenlagerung des Kindes</i></li> </ul>	1 Injektion  Bei ungenügendem Ansprechen nach 5-10 Min. wiederholen

### Andere Behandlungen:

.....

### Bemerkungen :

.....

.....

Name des Arztes und Unterschrift: .....