UNIVERSITÄTS-
KINDERSPITAL
ZÜRICH

Desensibilisierungsschema für Allergoid mite

Name, Vorname: …….. Geburtsdatum
…….
Desensibilisierungsindikation: ……..……..

Wichtigste Vorsichtsmassnahmen:

Vor jeder Injektion: Anamnese!

- o Aktuell Infekt (v.a. Fieber) ➔ Desensibilisierungsinjektion verschieben, Dosisreduktion o Nebenwirkungen nach letzter Injektion: Dosisanpassung, s.u.
- o Schlecht eingestelltes Asthma; aktuelle Behandlung mit Beta-Blocker, ACE-Hemmer; z.T. Autoimmunerkrankungen: Kontraindikationen für Desensibilisierungstherapie

Injektionen: tief subkutan an der Streckseite des Oberarms, ca. eine Handbreit über dem Ellenbogen, unter strenger ärztlicher Aufsicht.

Eine versehentliche intravenöse Injektion muss durch wiederholte Aspirationen während der Injektion ausgeschlossen werden. Eine versehentliche intramuskuläre oder intrakutane Injektion ist ebenfalls streng zu vermeiden.

Am Tag der Desensibilisierung: keine körperlichen Anstrengungen, nicht heiss baden.

Injektionen abwechselnd links und rechts

Unbedingt auch ausführliche Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Immunologie & Allergologie und Packungsprospekt des Allergenextraktes beachten.

Patient nach Injektion mindestens 30 Minuten überwachen

Massnahmen / Medikamente zur Behandlung von Nebenwirkungen (inklusive anaphylaktischer Schock, Larynxödem, Asthma) vorbereitet (siehe Notfallschema) Vorgehen bei Nebenwirkungen:

o Ausgeprägte Lokalreaktion nach letzter Injektion ➔ Wiederholung der letzten Dosis o Systemische Nebenwirkungen nach letzter Injektion ➔ allergologisches Konsilium,

Dosisreduktion o Prämedikation mit Antihistaminikum p. os vor weiteren Injektionen ist zulässig

---

Injektionen der Allergoid mite Lösungen s.c. zur Aufdosierung im Abstand von 7 Tagen. Nach Erreichen der vollen Dosis von 0.6ml, diese nach 2 Wochen weiderholen und danach Injektionen weiter mit 0.6ml 1x/4-6 Wochen.

Bereits verabreichte Injektionen:

1. Injektion: 0.1 ml von Flasche A
2. Inj.: 0.2 ml von Flasche A
3. Inj.: 0.4 ml von Flasche A
4. Inj.: 0.8 ml von Flasche A
5. Inj.: 0.1 ml von Flasche B
6. Inj.: 0.2 ml von Flasche B
7. Inj.: 0.4 ml von Flasche B
8. Inj.: 0.6 ml von Flasche B

Angaben zu den verabreichten Injektionen (inkl. allfällige Wiederholungen, Dosisreduktionen, etc.):

Injektionsdatum	Flasche	Dosis (ml)	Bemerkungen / Visum
……..	……..	……....	……

……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……
……	……	……	……