UNIVERSITÄTS-
KINDERSPITAL
ZÜRICH

INFORMAZIONI PER I GENITORI

Puntura di zecca

Das Spital der Eleonorenstiftung

Pronto soccorso centro pediatrico Kinderspital di Zurigo

Servizio di consulenza telefonica: +41 58 387 78 80

Come devo comportarmi nel caso in cui scopra una o più zecche sul corpo del mio bambino?

La o le zecche devono essere rimosse il più velocemente possibile mediante una pinzetta. In questa operazione la zecca deve essere presa quanto più possibile in prossimità della superficie della pelle e tirata via dalla sede della puntura con un movimento verso l'alto. Nel caso in cui non abbiate a disposizione una pinzetta, è possibile afferrare la zecca fra pollice e indice ed estrarla come indicato. Il sito della puntura deve essere subito disinfettato con un disinfettante comunemente in commercio.

Attenzione: nel momento in cui viene estratta la zecca fare attenzione a che la zecca venga ruotata il meno possibile. È anche importante non applicare alcun tipo di olio sulla zecca! Qualora al momento della rimozione della zecca rimangano attaccate la testa o le zampette, queste non devono essere necessariamente rimosse. È invece di fondamentale importanza che venga rimosso il corpo, in particolare il tratto gastrointestinale della zecca.

La zecca non deve essere conservata in quanto non viene effettuato alcun tipo di esame sull'animale.

A cosa devo fare particolarmente attenzione dopo una puntura di zecca e quando è necessario contattare il medico?

- Nel caso in cui fra i 3 e i 32 giorni dopo la puntura di zecca si manifesti un arrossamento del sito della puntura a forma circolare, che non causa dolore e che si allarga lentamente, è consigliabile contattare un medico.
- Febbre o forte mal di testa fra i 7 e i 14 giorni dopo la puntura di zecca.
- Gonfiori alle articolazioni di origine non determinata, in particolare localizzata alle ginocchia o all'articolazione tibio-tarsale (è possibile che tali gonfiori subentrino anche settimane o mesi dopo la puntura di zecca).
- Paralisi facciale su un lato (può manifestarsi fra le 3 e le 10 settimane dopo la puntura di zecca).

UNIVERSITÄTS-
KINDERSPITAL
ZÜRICH

Das Spital der Eleonorenstiftung

Universitäts-Kinderspital Zürich
Lenggstrasse 30
CH-8008 Zürich

www.kispi.uzh.ch
Telefon +41 44 249 49 49