

INFORMAÇÃO
PARA OS PAIS

Ferimentos na cabeça/ Concussão cerebral



Serviço de urgências Kinderspital Zürich

Telefone de aconselhamento pago: 0900 266 71 1

Deve estar atento aos seguintes sinais no seu filho nas 24 horas que se seguem ao acidente:

1) Dores de cabeça: É possível que o seu filho sinta ligeiras dores de cabeça. Estas devem desaparecer após administrar um analgésico adequado numa dosagem apropriada à idade (por ex. Panadol).

2) Vômito: O seu filho pode estar tonto, mas não deverá vomitar. Caso vomite, procure um médico.

3) Comportamento: O seu filho deve apresentar o seu comportamento comum. Sinais de que algo não está bem: confusão, irritabilidade, não bebe nem come.

4) Cansaço: É possível que o seu filho esteja mais cansado do que habitualmente. No entanto, desde que não vomite e o seu comportamento permaneça normal, não se deve preocupar. Conceda-lhe algum sossego

Volte ao hospital se

- o seu filho estiver confuso ou se comportar de forma anormal
- o seu filho se queixar de fortes dores de cabeça que não desaparecem após a toma de um analgésico
- o seu filho vomitar
- o seu filho se queixar de fraqueza ou dormência
- ou se estiver preocupado por qualquer outro motivo

Nos dias após o ferimento na cabeça, é possível que o seu filho se queixe de:

- Dores de cabeça ligeiras
- Problemas de concentração
- Cansaço
- Insónias

Caso estes sintomas não desapareçam no período de 48 horas, deve levar o seu filho ao médico/pediatra.

Deve evitar que o seu filho pratique actividades desportivas enquanto se manifestarem sintomas! Enquanto a criança apresentar dores de cabeça deve manter-se em descanso.