

BChild

In dieser Studie wird die Behandlung mit Bosutinib bei Kindern und jungen Erwachsenen mit der Diagnose einer chronischen myeloischen Leukämie untersucht. Bosutinib (Bosulif®) ist für die Behandlung von erwachsenen Patienten zugelassen. Das Studienmedikament kann einmal täglich zu Hause eingenommen werden.

Welche Patienten können in die Studie aufgenommen werden?

Patienten mit der Diagnose einer neu diagnostizierten chronischen Phase oder einer resistenten/intoleranten Philadelphia-positiven chronischen myeloischen Leukämie (CML).

Die Patienten sollten beim Einschluss in die Studie zwischen 1 und 25 Jahre alt sein.

Wie lange dauert die Studie und wie häufig sind die Besuche?

Im ersten Monat sind wöchentliche Besuche erforderlich, danach nur noch monatliche Besuche. Die Dauer der Studienbehandlung hängt vom Ansprechen ab.

Kontakt

Standort: Zürich, PI: Prof. Jean-Pierre Bourquin

Kontakt: sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch

Weitere Informationen

KOFAM: [Link](#)

Clinicaltrials.gov: [NCT04258943](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04258943)

BChild

In this study, treatment of Bosutinib is evaluated in children and young adults with the diagnosis of chronic myeloid leukemia. Bosutinib (Bosulif®) is approved for treatment of adult patients. The study drug can be taken once daily at home.

Which patients can be included in the trial?

Patients with a diagnosis of a newly diagnosed chronic phase or resistant/intolerant Philadelphia-positive Chronic Myeloid Leukemia (CML).

Patient should be between 1 and 25 years of age, when registering for the trial.

How long does the study last and how frequent are the visits?

In the first month weekly visits are necessary, afterwards only monthly visits. Duration of the study treatment depends on the response.

Contact

Site: Zürich, PI: Prof. Jean-Pierre Bourquin

Contact: sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch

More Information

KOFAM: [Link](#)

Clinicaltrials.gov: [NCT04258943](#)

BChild

Dans cette étude, le traitement par Bosutinib est évalué chez les enfants et les jeunes adultes avec le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique. Le bosutinib (Bosulif®) est approuvé pour le traitement des patients adultes. Le médicament à l'étude peut être pris une fois par jour à la maison.

Quels patients peuvent être inclus dans l'essai ?

Patients avec un diagnostic de phase chronique nouvellement diagnostiquée ou résistants/intolérants positifs à Philadelphie Leucémie myéloïde chronique (LMC).

Le patient doit être âgé de 1 à 25 ans au moment de son inscription à l'essai.

Combien de temps dure l'étude et quelle est la fréquence des visites ?

Au cours du premier mois, des visites hebdomadaires sont nécessaires, ensuite seules des visites mensuelles. La durée du traitement de l'étude dépend de la réponse.

Contact

Site: Zürich, PI : Prof. Jean-Pierre Bourquin

Contact: sabine.holzapfel@kispi.uzh.ch

Plus d'information

KOFAM: [Lien](#)

Clinicaltrials.gov : [NCT04258943](#)